

## Lettres de confrères

**Souhaitable à partir de la 1ère année, tout public étudiant, toute discipline médicale**

### Exercices de rédaction

1. Trouvez dans les deux tableaux (A et B) le destinataire de chaque formule initiale et finale d'une lettre :

A.

1. Mon chéri,	a. la mère
2. Chère maman,	b. un collègue
3. Ma biche,	c. une directrice
4. Cher Confrère,	d. un petit copain
5. Chère Madame,	e. une petite copine

B.

1. Veuillez agréer, Madame, l'assurance de mes salutations respectueuses.	a. la mère
2. Bisous.	b. un collègue
3. Bien à toi.	c. une directrice
4. Chaleureusement.	d. un petit copain
5. Cordialement.	e. une petite copine

2. Vous trouverez ci-dessous quelques formules initiales d'une lettre médicale de confrères. Choisissez les formules appropriées pour chacune des trois situations :

*Cher Confrère, Mon Cher Confrère, Cher Jean, Chère Amie, Monsieur, Cher Monsieur, Madame*

Un collègue médecin qu'on n'a pas rencontré :

Un collègue médecin qui est un très bon ami :

Un collègue médecin qui est un professeur réputé :

3. Lisez attentivement les trois lettres ci-après et répondez aux consignes :

a. Notez 5 mots-clefs qui renvoient à la pathologie et/ou à la (aux) solution(s) thérapeutique(s) envisagée(s) :

Exemple 1 :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Exemple 2 :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Exemple 3 :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

b. Mentionnez dans une phrase quelle est la raison des trois lettres de confrères :

Exemple 1 :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Exemple 2 :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Exemple 3 :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**Exemple 1**

Docteur Marie ANDRIET  
Chirurgien-Dentiste  
5, rue Charles et Henri Avril  
22140 CAVAN

Tel : 02 95 47 92 47  
Sur rendez-vous

Cavan, le 16/06/2013

Cher Confrère,

Je vous adresse Jacques ROUAND (17 ans). Sur la paro de 2013, les 38 et 48 ne semblent pas pouvoir évoluer. Les 85 et 75 sont toujours sur l'arcade (Agénésie de 35 et 45).

Au maxillaire, la 27 semble réservée (elle n'a pas beaucoup évolué depuis 4 ans d'après la paro de 2009).

Faut-il envisager l'extraction des 38 et 48 ?

Peut-il garder les 85 et 75 ?

Au maxillaire est-il préférable d'extraire la 27 pour laisser évoluer la 28 ? Ou bien extraire la 28 en assurant que la 27 aura une évolution.

Qu'en pensez-vous ?

Confraternellement,

Marie ANDRIET

**Exemple 2**

Dr. Sophie LACOSTE  
Médecin généraliste  
32 rue Des Universités  
29340 Brest  
Tel: 02.98.443.40.14

Fax: 02.98.443.63.85

Brest, le 01/06/2013

Cher confrère,

Monsieur Alain Terrieur, 58 ans, se plaint depuis plusieurs semaines de précordiales d'effort. Je vous rappelle ses antécédents: une surcharge pondérale avec IMC à 28, un tabagisme actif évalué à 40 PA, une HTA. Son père est décédé d'infarctus inaugural à 66 ans. Sa mère est suivie pour un diabète de type II. Sa dernière épreuve d'effort remonte à deux ans et était normale. Ci-joint au verso le suivi de son bilan lipidique et de ses glycémies.

Son traitement actuel associe : Ramipril 10 mg/jour, Spiriva 1 gélule par jour à inhaler, Alfuzozine LP 10 mg (pour son problème prostatique).

Son état nécessite de nouveau un bilan d'évaluation de son réseau coronarien.

Veillez recevoir, Cher confrère, l'assurance de mes salutations les meilleures.

Sophie LACOSTE

**Exemple 3**

Joëlle LEROUX  
Tel: 02.98.443.40.14  
Fax: 02.98.443.63.85  
25970 Nancy

CHU BRABOIS  
Pneumologie

NANCY, le 26/06/2013

Chère Liana,

Je te remercie de m'avoir adressé en consultation, Mme Elena NICORA, née le 12.02.1941, qui présente une volumineuse lésion lobaire supérieure droite para-médiastinale découverte d'une toux présente depuis quelques mois.

Cette lésion s'accompagne au scanner d'une adénopathie de la loge de Baréty, et le scanner encéphalique ne montre pas de lésions.

Un Petscanner est prévu dans 48 heures. La fonction respiratoire est satisfaisante. L'endoscopie bronchique est normale. Le bilan cardiologique est également satisfaisant.

Il semble effectivement exister une indication à réaliser une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire à condition que le Petscanner ne montre pas de localisation secondaire.

Si l'adénopathie de la loge de Baréty est isolée et hypermétabolique, on peut effectivement envisager la réalisation d'une lobectomie avec curage d'emblée, suivi du traitement adjuvant.

Je propose à Mme NICORA d'être hospitalisée dans notre service le 03.05.2013 pour être opérée le 04.05.2013.

Je ne manquerai pas de te tenir informée des suites.

Meilleures salutations.

Docteur Joëlle LEROUX,  
Praticienne Hospitalière

4. Selon les exemples présentés, rédigez deux lettres de confrères pour les situations suivantes :
- a) Madame Picot, 46 ans, a un granulome à la 16. Elle a de l'hypertension et l'extraction ne peut pas être réalisée dans le cabinet dentaire. Rédigez une lettre de confrère vers le CHU Brest, afin qu'on la reçoive et qu'on lui fasse l'extraction de la 16.
  - b) Monsieur Thibault, 55 ans, a une HTA (180/100 mmHg) et des téguments cyanotiques. Rédigez une lettre de confrère pour l'envoyer chez le cardiologue pour effectuer le bilan et le traitement adéquat.